

**Opća Bolnica Pula
Djelatnost za anesteziju
i intenzivno liječenje**

Ime i prezime _____ Datum rođenja _____

Upitnik i informirani pristanak za anesteziološki postupak kod “bezbolnog poroda”

Poštovana,

Vi se spremate za opstetrijski postupak- porod.

Da bi se što bolje pripremili dobro pročitajte ovaj upitnik Dodatna pitanja i objašnjenja tražite od liječnika-anesteziologa u razgovoru u anesteziološkoj ambulanti ili prije poroda.

Danas se većina postupka može raditi manje bolno, primjenom različitih anestezioloških postupaka pa tako i porod. U daljnjem tekstu su ukratko objašnjene pojedinosti vezane za postupak anesteziologa kod “bezbolnog poroda”.

Prije svakog anesteziološkog postupka bolesnica obavi sve potrebne pretrage, pregledana je u anesteziološkoj ambulanti (ili bolesničkoj sobi) gdje obavi i razgovor sa anesteziologom. U tom razgovoru anesteziolog ocijeni Vaše zdravstveno stanje i u razgovoru s Vama odluči se o eventualnom “bezbolnom porodu “ uz dogovor sa Vašim ginekologom.

PERIDURALNA ANESTEZIJA (ANALGEZIJA)

Kod tzv. “bezbolnog poroda” izvodi se periduralna analgezija Blokiraju se živci koji izlaze iz kraljezničke moždine i idu prema maternici i prekida se prijenos podražaja koji izaziva bol.

U sjedećem ili položaju na boku, vrlo tankom iglom punktira se koža između dva kralješka u visini struka, odnosno bokova. Posebnom iglom se ubode između dva kralješka, i daje se lokalni anestetik u prostor između ovojnice kraljezničke moždine – periduralni prostor, bilo tom iglom ili kroz tanku cjevčicu (kateter) koja su u periduralni prostor uvede kroz tu iglu. Na taj način se lokalni anestetik kroz duže vrijeme može ponavljano davati.

NEPOŽELJNE POPRATNE POJAVE I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

Kod današnjih naprednih anestezioloških postupaka i dobrog nadzora bolesnika vrlo rijetko se događaju ozbiljne komplikacije. Ali neželjene popratne pojave i komplikacije zbog primjene lijekova i određenih postupaka ipak se događaju.

Ni jedan medicinski postupak nije bez izvjesnog rizika. Rizik za nastanak nepoželjnih pojava i komplikacija za vrijeme opstetrijskog i anesteziološkog postupka ovise u prvom redu od vrste i težine eventualne osnovne bolesti, pratećih bolesti, dobi bolesnika, trenutnog zdravstvenog stanja i životnih navika. A i mnogi drugi čimbenici mogu utjecati na povećanje rizika.

Popratne moguće pojave i komplikacije

- na mjestu uboda igle mogu se javiti krvni podljevi i upala
- tromboza (krvni ugrušak u veni) i embolija (odvajanje krvnog ugruška i plutanje venom)

- upala vene kod davanja lijeka u venu
- smetnje mokrenja i potencije nakon regionalne anestezije
- prolazni značajni pad tlaka i glavobolja nakon periduralne analgezije
- alergijske reakcije zbog primjene pojedinih lijekova
- poremećaji rada srca i cirkulacijski poremećaji (pad i porast tlaka)
- poremećaji disanja
- poremećaji drugih organskih funkcija zbog djelovanja lijekova ili drugih organskih poremećaja
- ozljeda tvrde moždane opne

Teške i ozbiljne komplikacije, a i smrt zbog anestezije, javljaju se izuzetno rijetko.

VAŽNA UPOZORENJA PRIJE ANESTEZIJE

Svojim ponašanjem možete znatno pridonijeti sigurnosti anestezioloških postupaka:

- prije anestezije morate biti natašte; najmanje 6 sati prije zahvata ne smijete jesti i piti
- lijekove koje stalno uzimate, uzeti samo u dogovoru s anesteziologom
- izvaditi umjetno zubalo, naočale, kontaktne leće, slušni aparat, skinuti nakit i ostaviti na odjelu, baciti žvakaću gumu
- ne stavljati puder na lice ili lakirati nokte, obaviti dobru osobnu higijenu
- nakon premedikacije ostati u bolničkom krevetu
- na postavljena pitanja iskreno odgovorite i za sve nejasnoće bez suzdržavanja pitajte

PRISTANAK ZA DAVANJE PERIDURALNE ANALGEZIJE U SVRHU “BEZBOLNOG PORODA”

Informirana sam i jasni su mi postupci i moguće komplikacije za vrijeme davanja i trajanja periduralne analgezije i pristajem da mi se da u svrhu “bezbolnog poroda”.

Potpis roditelja

Ime i prezime anesteziologa

Potpis anesteziologa

Datum
