

Pisana obavijest o CARSKOM REZU

U skladu sa člancima 6, 8, 9 i 16. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, NN 37/08), članku 22. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08), članka 19. Zakona o liječništvu (NN 121/03, NN 117/08), Pravilnika o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka (NN 10/08) te Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove-Prilog V. Prava pacijenata – Pristanak/odbijanje obaviještenog pacijenta (NN 31/11), liječnik specijalist _____ obavijestio je mene, _____

(ime i prezime specijalista)

(ime i prezime pacijenta, datum rođenja)

o dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku te da postoje određeni **rizici i moguće komplikacije** koji mogu nastati tijekom i nakon izvođenja istog

Što je carski rez? Operacija carskog reza je porođaj djeteta kroz rez na stijenci maternice i donjem dijelu trbuha.

Kako se izvodi? Operacija započinje kirurškim rezom kože donjeg dijela trbuha nakon čega se razdvajaju slojevi trbušne stijenke i prereže stijenka maternice. Dijete se vadi iz maternice u trbušnu šupljinu i porođa kroz donji dio trbušne stijenke, nakon čega se odstrani posteljica, te kirurške rane zašiju

Koje su dobrobiti? Carski rez se izvodi u interesu kada postoji nesrazmjer između veličine djeteta i porođajnog kanala, zastoj porođaja uslijed nepovoljnog položaja djeteta ili nepravilnosti trudova, te u svim drugim razlozima kada je ugroženo zdravlje novorođenčeta ili majke u toj mjeri da dobrobiti operacije nadilaze rizike vaginalnog porođaja.

Koji su rizici carskog reza?

- U tijeku izvođenja carskog reza moguća je slučajna ozljeda mokraćnog mjehura, crijeva i drugih unutarnjih organa kao i infekcija tih istih organa za vrijeme oporavka.
- Prilikom zarezivanja maternice i porođaja novorođenčeta carskim rezom može se pojaviti nekontrolirano obilno krvarenje zbog kojega ponekad treba izvesti njezino odstranjenje.
- Svaki veći operativni zahvat, pa tako i porođaj carskim rezom, povećava mogućnost nastajanja ugrušaka u krvnim žilama, što može dovesti do plućne embolije, infarkta ili moždanog udara. Radi prevencije tih komplikacija roditelji se nakon porođaja daje heparin koji smanjuje mogućnost pojave ugrušaka, ali je potpuno ne uklanja.
- Ukupni gubitak krvi i potreba za transfuzijom veća je u usporedbi sa vaginalnim porodom i zahtjeva duži oporavak majke, a time i dužu hospitalizaciju. U nekim slučajevima roditelji porođene carskim rezom moraju se nadzirati u jedinicama intenzivne skrbi.
- Nakon zahvata pojavljuje se bol na području reza kože, a u narednim mjesecima na tom mjestu može postojati neosjetljivost. Nadalje, priraslice unutar trbuha koje mogu postojati nakon zahvata ponekad uzrokuju nelagodu ili bol koja može trajati godinama, te mogu otežavati izvođenje svake buduće operacije u tom području.
- Nakon zahvata teže je uspostaviti dojenje i to u prvom redu zbog sporijeg oporavka majke. Djeca koja se ne doje majčinim mlijekom imaju veći rizik od astme, alergija, respiratornih infekcija, dijabetesa i drugih poremećaja.
- Ožiljak maternice može uzrokovati komplikacije budućih trudnoća. Ako se posteljica u narednoj trudnoći usadi u područje ožiljka može nastati placenta previja (posteljica preko ušća maternice), krvarenje u toku trudnoće i nakon poroda, pobačaj ili prijevremeni porod.

- Trudnice koje su rodile carskim rezom imaju veću vjerojatnost da će i sljedeća trudnoća završiti carskim rezom. Ponavljani carski rez nosi veći rizik komplikacija u toku zahvata u odnosu na prvi.
- Ako se carski rez izvede elektivno (prije spontanog početka trudova) postoji mogućnost da dijete bude nedonešeno.
- Djeca porođena carskim rezom teže se adaptiraju na vanjski svijet. Ona se zbog respiratornih problema, teškoća pri uzimanju hrane i novorođenačke žutice češće hospitaliziraju u jedinicama intenzivne njege u odnosu na novorođenčad iz vaginalnog porođaja. Do problema dolazi zbog anestezije koju majka prima u carskom rezu, ali i zbog nedostatka odgovarajuće pripreme koja se dešava tijekom trudova i mehanizma vaginalnog porođaja.
- Prilikom operacije carskog reza postoji opasnost od slučajne kirurške ozljede djeteta.

Zbog svega navedenog carski se rez izvodi samo onda kada je korist tog kirurškog zahvata značajno veća u odnosu na moguće komplikacije.

Što se događa nakon porođaja carskim rezom? Kraće vrijeme nakon carskog reza nećete moći piti i jesti. Moguće je da ćete imati bolove i dobivati analgetike, a poteškoće se mogu javiti i prilikom mokrenja. Iz tih razloga pružit će vam se posebna skrb kako bi se čim prije oporavili do mjere da možete doći, a smještaj na odjelu babinjača organiziran je u sistemu rooming-in (majka i dijete u zajedničkoj sobi).

Zamjenski postupci: Alternativa carskom rezu je porođaj vaginalnim putem.

Potpis i faksimil odgovornog doktora
medicine za obavljanje postupka :

Datum:

Izjava pacijenta

Svojim potpisom potvrđujem da sam detaljno upoznat/a s koristima i rizicima postupka, s drugim dijagnostičkim odnosno terapijskim mogućnostima, da sam razumio/la pročitano te da sam mogao/la postaviti pitanja liječniku u svrhu razjašnjavanja nejasnoća. Istim potpisom potvrđujem da shvaćam i prihvaćam da, ukoliko se u tijeku visokorizičnog postupka (kirurških ili ostalih invazivnih postupaka) ukažu novi neočekivani momenti, isti mogu tijekom zahvata promijeniti i zahvat može završiti na način različit od ranije mi objašnjenog, a razlozi istoga će mi nakon zahvata biti objašnjeni.

Datum: _____

Potpis pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika : _____