

## Pisana obavijest o epiduralnoj anesteziji za bezbolni porod

U skladu sa člancima 6, 8, 9 i 16. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, NN 37/08), članku 22. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08), članka 19. Zakona o liječništvu (NN 121/03, NN 117/08), Pravilnika o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka (NN 10/08) te Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove-Prilog V. Prava pacijenata – Pristanak/odbijanje obaviještenog pacijenta (NN 31/11), liječnik specijalist \_\_\_\_\_ obavijestio je mene, \_\_\_\_\_

(ime i prezime specijalista)

(ime i prezime pacijenta, datum rođenja)

o dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku te da postoje određeni **rizici i moguće komplikacije** koji mogu nastati tijekom i nakon izvođenja istog

<b>Naziv i opis postupka: Epiduralna analgezija za bezbolni porod</b> Postupak se izvodi u sjedećem položaju ili ležeći na boku, a u oba slučaja savijenih, „pogrbljenih“ leđa. Nakon postizanja primjerenog položaja, antiseptičkom se otopinom opere mjesto na kojem se planira postaviti kateter. Nakon toga se anestezira mjesto uboda na leđima (između kralježaka) malom količinom lokalnog anestetika, pa se potom debljom iglom- vodlicom probije koža i napreduje kroz strukture do epiduralnog prostora. Nakon lokacije, kroz iglu se plasira epiduralni kateter, dok se igla vodilica pažljivo odstrani. Nakon toga, moguće je davanje lijekova na epiduralni kateter. Upoznajte svog liječnika s alergijama, bolestima i tijekom trudnoće. Prije postavljanja epiduralnog katetera, postavit će Vam se venski put, priključiti infuzija, a možda i „drip“. Prilikom postavljanja epiduralnog katetera, važno je da budete mirni i da upozorite liječnika da li su se pojavili trudovi. Postavljanje traje oko 20 minuta, još toliko je potrebno da analgezija prodjeluje.	
<b>Dobrobiti :-</b>	u većini slučajeva pruža odličnu analgeziju- „obezboljenje „ poroda - ponekad se daje zajedno sa „spinalnom“ da se ubrza nastup analgezije - doza i vrsta lokalnog anestetika može biti promijenjena da se omogući očuvanje mišićne snage(hod) - u načelu, nema utjecaja na novorođenče - može se kombinirati s „općom“ anestezijom, u slučaju da je potreban i carski rez
<b>Rizici :</b>	- značajan pad krvog tlaka - nedovoljan učinak na smanjenje bolnosti - glavobolja, svrbež kože, nesvjestica - oštećenje živca/živaca, neurološke posljedice koje traju više mjeseci ili trajno - intravaskularno postavljanje katetera, periduralni apsces(infekcija), meningitis, periduralni hematoma - teške ozljede, uključujući oduzetost, iznimno rijetko i smrtni ishod
<b>Zamjenski postupci</b> Primjena lijekova protiv bolova intravenski, intramuskularno ili subkutano.	
Potpis i faksimil odgovornog doktora medicine za obavljanje postupka :	Datum:

## Izjava pacijenta

Svojim potpisom potvrđujem da sam detaljno upoznat/a s koristima i rizicima postupka, s drugim dijagnostičkim odnosno terapijskim mogućnostima, da sam razumio/la pročitano te da sam mogao/la postaviti pitanja liječniku u svrhu razjašnjavanja nejasnoća. Istim potpisom potvrđujem da shvaćam i prihvaćam da, ukoliko se u tijeku visokorizičnog postupka (kirurških ili ostalih invazivnih postupaka) ukažu novi neočekivani momenti, isti mogu tijekom zahvata promijeniti i zahvat može završiti na način različit od ranije mi objašnjenog, a razlozi istoga će mi nakon zahvata biti objašnjeni.

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika : \_\_\_\_\_