

Pisana obavijest o perkutanoj dilatacijskoj traheotomiji

U skladu sa člancima 6, 8, 9 i 16. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, NN 37/08), članku 22. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08), članka 19. Zakona o liječništvu (NN 121/03, NN 117/08), Pravilnika o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka (NN 10/08) te Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove-Prilog V. Prava pacijenata – Pristanak/odbijanje obaviještenog pacijenta (NN 31/11), liječnik specijalist _____ obavijestio je mene, _____

(ime i prezime specijalista)

(ime i prezime pacijenta, datum rođenja)

o dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku te da postoje određeni **rizici i moguće komplikacije** koji mogu nastati tijekom i nakon izvođenja istog

Naziv i opis postupka: Perkutana dilatacijska traheotomija - postupak kojim se žica vodilica uvede kroz punkcijsku iglu najčešće između 2. i 3. trahealnog prstena u lumen dušnika - preko žice vodilice dilatatorima se proširi otvor u trahealnom zidu te se preko iste vodilice plasira traheostoma u lumen dušnika
Dobrobiti : - poboljšava higijenu usne šupljine te olakšava čišćenje i toaletu dišnih putova - smanjuje otpor u dišnim putovima, mrtvi prostor te rad pri spontanom disanju, omogućava hranjenje na usta, verbalnu komunikaciju i mobilnost bolesnika - lakše se podnosi te su manje potrebe za analgosedativima, poboljšava komfor i povećava sigurnost bolesnika - smanjuje se učestalost i težina ozljeda grkljana i dušnika kao i oštećenja usnica i usta - manja učestalost nozokomijalnih sinusitisa, olakšava i ubrzava odvajanje bolesnika od strojne ventilacijske potpore, skraćuje se liječenje u JIL-u, smanjuje smrtnost u odnosu na produženu translaringealnu intubaciju
Rizici : - smrtni ishod, krvarenje, hipoksemija, hiperkarbija, hemodinamska nestabilnost - paratrahealno uvođenje kanile, subkutani emfizem, pneumotoraks, pneumomediastinum, neželjena dekanulacija, infekcija stome, traheoarterijska fistula, traheozofagealna fistula, oštećenje živaca grkljana - opstrukcija kanile, otežano zacjeljivanje stome te nakon dekanulacije nastanak neestetickog ožiljka, promjene glasa, traheokutana fistula, traheomalacija, suženje lumena dušnika i grkljana
Zamjenski postupci : - otvorena kirurška traheotomija u operacijskoj Sali - otvorena kirurška traheotomija uz krevet bolesnika - translaringealna perkutana traheotomija
Potpis i faksimil odgovornog doktora medicine za obavljanje postupka : _____ Datum: _____

Izjava pacijenta

Svojim potpisom potvrđujem da sam detaljno upoznat/a s koristima i rizicima postupka, s drugim dijagnostičkim odnosno terapijskim mogućnostima, da sam razumio/la pročitano te da sam mogao/la postaviti pitanja liječniku u svrhu razjašnjavanja nejasnoća. Istim potpisom potvrđujem da shvaćam i prihvaćam da, ukoliko se u tijeku visokorizičnog postupka (kirurških ili ostalih invazivnih postupaka) ukažu novi neočekivani momenti, isti mogu tijekom zahvata promijeniti i zahvat može završiti na način različit od ranije mi objašnjene, a razlozi istoga će mi nakon zahvata biti objašnjeni.

Datum: _____

Potpis pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika : _____